

大きい入れ歯と小さい入れ歯ではどっちが良いの？

代々木歯科

南條 芳久




しかし、総入れ歯になると、食べる時に不自由なだけでなく、大きく口を開いた時や話をしていても、入れ歯が外れやすくなりま

唾液が接着剤

乾燥した磨りガラスを2枚合わせても接着することはありませ

大きいのが主流

私が歯科医師になった30年前の入れ歯は、湯飲み茶碗の中で洗えるほど小さい物が主流でした。大学で習った通りに入れ歯を作ると



小さな入れ歯と大きな入れ歯

倍以上の大きさになり、大きい入れ歯はどうしても違和感が強く、患者さんからは

「大きすぎる」と不評でした。しかし、現在では大きい入れ歯が主流で

上下で異なる

上と下の入れ歯を比較すると、上の入れ歯は面積が広く半円形ですが、下の入れ歯は馬蹄形をしていて面積が

しても外れやすいので、特に、歯を支えてきたアゴの骨が吸収し、歯が無くなるとますます入れ歯が安定せず、

歯は、噛む力で入れ歯が動揺しても内面に空気が入りにくいので、ほとんどのケースでめ

もちろん、ただ大きければ良いわけではありませぬ。大きすぎる

泌尿器科の感染症について

膀胱炎

「数日前からおしっこをするのが痛い」、「何度尿に行ってもすっきりしない」と困って、泌尿器科を受診する女性

尿道炎

一方、男性では尿道炎が多く見られます。特に問題になるのは「クラミジア尿道炎」と「淋病(淋菌性尿道炎)」です。どちらも

代々木病院泌尿器科 一ノ瀬義雄(医師)

日常生活の注意事項としては、水分を多く取り身体を冷やさないことも大切です。

特に女性では症状がほとんどないため治療機会を逸することもあり、進行すると骨盤内に炎症がおよび不妊の原因となることがあります。そのため男性に

クラミジアが認められた場合は、必ずセックスパートナーも検査する必要があります。

クラミジアは感染しても症状が比較的軽い

ため、受診が遅れることが多く、また潜伏期間も2〜3週間と長いので感染の経路が

ません。さらに通常の抗生物質にも耐性を示すため、適切な抗生物質の選択が必要です。

ワクチンについて

陰部にできる病気にコンジローマというイボのようなものがあります。「パピローマウイルス」が原因とされ、男性ではコンジローマを起しますが、

女性では子宮頸がんの原因となることがわかっています。

子宮頸がんは20〜30代の女性が発症するがんの中の第一位で、

ピロロマウイルスの「タイプ16と18」が関連していると考えられています。

性教育もむやみに道徳的に厳しくするのは

最近、外国ではすでに一般的であった子宮

クスは非常に危険なのだということ、わかりやすく啓発することが重要だと思

頸がんワクチンが、日本でもやっと使用できるようになりました。日本では行政のかわり

方やマスコミの誤った情報もあり、一般国民にワクチン

強いですが、本来はワクチンで予防する

春休み医学生実習 随時受付中

代々木病院ではいつでも医学生実習を受入れています。医学生の知り合いがいましたら、ぜひご紹介下さい。

■問い合わせ先

代々木病院医学生室 大谷・山本
☎ : 03-3404-7680
E-mail : yo_igakusei@tokyo-kinikai.com



▼今年は何減少？

この時期、気になり始めるのは花粉症ではないでしょうか。今年のスギ花粉は大量飛散した去年と比べると減少すると

花粉症の三大症状はくしゃみ・鼻水・鼻づまりといわれていますが、人によ



花粉症と薬

小澤 瑞恵 (薬剤師・たくみ外苑薬局)

くすりの話あれこれ

くすりの話あれこれ

▼用法を守って

飲み薬の一部には緑内障や前立腺肥大の症状を悪化させる場合があります。緑内障や前立腺肥大と診断されている方は必ず医師や薬剤師に伝えて下さい。

また、花粉症の薬には点鼻薬や点眼薬もあります。飲み薬に比べると全身への副作用が少ないと言われている

これらの症状をできるだけ軽くするため、花粉が飛び始める2週間くらい前から治療

昔の薬に比べ、最近では眠気の出にくい薬もあり

一部の点鼻薬には漫然と使うことで逆に鼻づまりを起す

花粉症の薬はアレルギーを起す物質のヒスタミンを抑えることで

しかし、そういった薬でも人によっては眠

医師や薬剤師にご相談ください。



渋谷区・石井和子